

Calendario de vacunación

Del nacimiento
a los 18 años

Se recomienda aplicar las vacunas
contra la influenza (gripe) cada año a
partir de los 6 meses.

Es necesario mantener a niños y
adolescentes al día con las vacunas
contra el COVID-19.

<p><u>Al nacer</u></p> <p>HepB</p>	<p><u>A los 12 meses</u></p> <p>MMR Varicella HepA PCV</p>	<p><u>9-10 años</u></p> <p>HPV (2 dosis entre 9-12 años)</p>
<p><u>A los 2 meses</u></p> <p>DTaP-IPV-Hib-HepB PCV Rotavirus (oral)</p>	<p><u>A los 15 meses</u></p> <p>DTaP Hib</p>	<p><u>11-12 años</u></p> <p>Tdap MenACWY</p>
<p><u>A los 4 meses</u></p> <p>DTaP-IPV-Hib-HepB PCV Rotavirus (oral)</p>	<p><u>18-24 meses</u></p> <p>HepA</p>	<p><u>16 años</u></p> <p>MenACWY</p>
<p><u>A los 6 meses</u></p> <p>DTaP-IPV-Hib-HepB PCV Rotavirus (oral)</p>	<p><u>A los 4 años</u></p> <p>MMRV DTaP-IPV</p>	<p><u>16-18 años</u></p> <p>MenB (2 dosis) consulte con su médico</p>

Clave de las vacunas:

DTaP: Diphtheria, Tetanus, Pertussis (tos ferina)
HepA: Hepatitis A
HepB: Hepatitis B
Hib: Haemophilus influenzae tipo b
HPV: Human Papillomavirus
IPV: Inactivated Polio Virus
MenACWY: Meningococcal A, C, W, Y (meningitis)
MenB: Meningococcal B (meningitis)
MMR: Measles, Mumps and Rubella
PCV: Pneumococcal (neumonía)
Tdap: Tetanus, Diphtheria, Pertussis (tos ferina)
Varicella: varicela

Vacunas combinadas (sujetas a disponibilidad):

MMRV: Measles Mumps, Rubella and Varicella
Pediarix: Vacuna combinada que incluye DTaP-HepB-IPV
Pentacel: Vacuna combinada que incluye DTaP-IPV/Hib
Vaxelis: Vacuna combinada que incluye DTaP-IPV-Hib-HepB

Encuentre más información en:
[cdc.gov/vaccines](https://www.cdc.gov/vaccines)